

TABEL Veiligheidsclassificatie van geneesmiddelen voor behandeling van astma tijdens zwangerschap of lactatieperiode volgens Lareb^{††}

Lareb-classificatie; geneesmiddel	tijdens zwangerschap*†§	tijdens lactatie ¶††§§
kortwerkende bèta-2-sympathicomimetica		
salbutamol	ruime ervaring; kan gebruikt worden	veiligst; handhaven
terbutaline	ruime ervaring; kan gebruikt worden	veiligst; handhaven
langwerkende bèta-2-sympathicomimetica		
formoterol	onvoldoende ervaring; risico onbekend	waarschijnlijk veilig
salmeterol	ruime ervaring; kan gebruikt worden	waarschijnlijk veilig
kortwerkende parasymphatholytica		
ipratropium	onvoldoende ervaring; risico onbekend	waarschijnlijk veilig
langwerkende parasymphatholytica		
tiotropium	onvoldoende ervaring; risico onbekend	mogelijk risico
ICS		
fluticason	ruime ervaring; kan gebruikt worden	waarschijnlijk veilig
budesonide	ruime ervaring; kan gebruikt worden	veiligst; handhaven
beclometason	ruime ervaring; kan gebruikt worden	veiligst; handhaven
ciclesonide	onvoldoende ervaring; risico onbekend	waarschijnlijk veilig
combinatiepreparaten met overige stoffen		
fenoterol/ipratropium	onvoldoende ervaring; risico onbekend	waarschijnlijk veilig
vilanterol/fluticasonfuroaat	onvoldoende ervaring; risico onbekend	risico onbekend
leukotriënantagonisten		
montelukast	onvoldoende ervaring; risico onbekend	risico onbekend
nasale glucocorticoiden		
budesonide	ruime ervaring; kan gebruikt worden	veiligst; handhaven
fluticason	ruime ervaring; kan gebruikt worden	waarschijnlijk veilig
beclometason	ruime ervaring; kan gebruikt worden	veiligst; handhaven
antihistaminica		
cetirizine	ruime ervaring; kan gebruikt worden	waarschijnlijk veilig
loratadine	ruime ervaring; kan gebruikt worden	waarschijnlijk veilig
clemastine	ruime ervaring; kan gebruikt worden	risico; stoppen
rupatadine	onvoldoende ervaring; risico onbekend	risico onbekend
immunomodulantia		
omalizumab	onvoldoende ervaring; risico onbekend	waarschijnlijk veilig
mepolizumab	onvoldoende ervaring; risico onbekend	risico onbekend
reslizumab	onvoldoende ervaring; risico onbekend	risico onbekend
subcutane of -linguale immunotherapie	ruime ervaring; kan gebruikt worden	risico onbekend
systemische glucocorticoiden		
prednisolon	farmacologisch effect; controle bij gebruik	veiligst; handhaven
triamcinolonacetonide	farmacologisch effect; controle bij gebruik	waarschijnlijk veilig

ICS = inhalatiecorticosteroiden.

* Categorie 'ruime ervaring; kan gebruikt worden': geneesmiddelen die gebruikt worden in onderzoek of in de praktijk zonder dat een verhoogde prevalentie van aangeboren afwijkingen dan wel andere directe of indirecte nadelige effecten op het embryo, de foetus of de pasgeborene is waargenomen. Geneesmiddel **kan gebruikt worden**.

† Categorie 'farmacologisch effect; controle bij gebruik': geneesmiddelen waarvan bekend is of kan worden vermoed dat zij farmacologische effecten hebben op het embryo, de foetus of de pasgeborene. Gebruik van geneesmiddel **afwegen**; bij gebruik controleren op nadelige effecten. Verwijs patiënte voor geavanceerd ultrageluidonderzoek bij 20 weken zwangerschap in plaats van gebruikelijke structureel echoscopisch onderzoek (SEO) bij 20 weken zwangerschap.

§ Categorie 'onvoldoende ervaring; risico onbekend': geneesmiddelen waarvan onvoldoende gegevens bekend zijn over het effect bij de mens om de risico's voor de zwangerschap en het ongeboren kind vast te stellen. Gebruik van geneesmiddel **afwegen**; bij voorkeur kiezen voor een geneesmiddel waarvan meer bekend is over de risico's. Verwijs patiënte voor geavanceerd ultrageluidonderzoek bij 20 weken zwangerschap in plaats van gebruikelijke SEO bij 20 weken zwangerschap.

|| Categorie 'veiligst; handhaven': borstvoeding en gebruik van dit geneesmiddel kunnen worden gecombineerd. Binnen de geneesmiddelgroep is dit middel de veiligste keuze; soms kunnen meerdere geneesmiddelen binnen één groep als veiligste keuze worden beschouwd.

¶ Categorie 'waarschijnlijk veilig': op basis van beschikbare informatie lijkt er geen bezwaar tegen gebruik van dit geneesmiddel tijdens borstvoeding.

** Categorie 'risico onbekend': er is geen of zeer beperkte informatie over gebruik van dit geneesmiddel tijdens borstvoeding. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid.

†† Categorie 'mogelijk risico': geneesmiddel kan mogelijk een risico opleveren voor de zuigeling. Noodzaak en mate van gebruik door de moeder dienen afgewogen te worden tegen het mogelijke risico voor het kind.

§§ Categorie 'risico; stoppen': het is niet veilig om borstvoeding en gebruik van dit geneesmiddel te combineren. Indien mogelijk kan gekozen worden voor een veiliger geneesmiddel; anders dient borstvoeding al dan niet tijdelijk gestopt te worden.